

CETACODEINE

(TABLETS)



COMPOSITION:

Each 1 tablet contains:
Paracetamol 500 mg.
Codeine phosphate 10 mg.

PROPERTIES:

Paracetamol and codeine combine the central analgesic effect of codeine and the peripheral analgesic and antipyretic effects of paracetamol. These components are well absorbed after oral administration. Paracetamol acts by the inhibition of prostaglandin synthesis resulting in analgesic and antipyretic actions.

INDICATIONS:

This product is indicated to treat mild to moderate pain, migraine, headache, rheumatoid arthritis, dysmenorrhea, teeth pain, influenza, neuralgias and pharyngitis. CONTRAINDICATIONS:

This product should not be used in case of sensitivity to any of its components or in patients with liver failure.

DRUG INTERACTIONS:

Prescribed cautiously when using with the following medications:

1- Central analgesics.

2- CNS suppressants including: Alcohol, anxiolytic, antihistamine and anti-Spasmodic drugs.

SIDE EFFECTS:

Rarely observed; but in some cases there is drowsiness, vertigo, sweating, constipation and nausea.

WARNINGS:

This product should not be given to patients with severe head injuries and acute abdominal conditions except by medical prescription. The drug should be used cautiously in cases of Addison's disease, prostatomegaly, severe renal or liver failure. Patients using Cetacodeine should take care when driving and working on machinery.

OVERDOSE:

An overdose of paracetamol may cause serious damage to the liver and kidneys. Never exceed the prescribed dose.

If this medicine is taken regularly for long periods of time, it can develop tolerance and it may become less effective in relieving pain. with prolonged use, the body may also become dependent to codeine.

PREGNANCY AND LACTATION:

It should be used cautiously during lactation. Cetacodeine is classified (pregnancy category C), therefore it must be taken only by medical prescription and when the potential benefit is greater than the fetal risk.

DOSAGE:

Children over 12 years old and adults: (1-2) tablet (3-4) times daily.

PRESENTATIONS:

Box of 30 tablets.

PK0258/02



Ultra Medica Pharmaceutical Industries: Sednaya - Damascus - Syria
Tel.: +963 11 5955339 – Fax: +963 11 5975174
E-mail: info@ultra-medica.net – www.ultra-medica.net



سيتاكودئين

(مضغوطات)

التركيب: كل مضغوطة تحتوي:
باراسيتامول ٥٠٠ ملغم.
كودئين فوسفات ١٠ ملغم.

خواص المستحضر:

إن الباراسيتامول والكودئين يجمعان التأثير المركزي المسكن للألم للكودئين والتآثير المحيطي المسكن للألم والخاصق للحرارة للباراسيتامول. وكل هذه المركبات جيدة الامتصاص عن طريق الفم. يؤثر الباراسيتامول عن طريق تثبيط تركيب البروستاغلاندين، وهذا يشرح خواصه الخاصة للحرارة والمسكينة للألم.

الاستطباب:

إن مستحضر سيتاكودئين ذو تركيبة خاصة لمعالجة الألام الخفيفة والمتوسطة ولمعالجة آلام الشقيقة، الصداع، الآلام الروماتيزمية، عسر النعس، آلام الأسنان، أعراض الرشح والأفلونزا، التهاب البلعوم والحرارة، آلام الأعصاب.

مضادات الاستطباب:

يجب أن لا يستعمل هذا المستحضر للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه أحد مكوناته أو المصايبين بقصور كبدى.

التأثيرات الجانبية:

تأثيراته الجانبية دائرة ولكن قد يسبب مستحضر سيتاكودئين الإحساس بالتعاس، دوار، تعرق، إمساك وغثيان.

التدخلات الدوائية:

يجب الحذر عند استعمال مستحضر سيتاكودئين مع الأدوية التالية:
- مسكنات آلام المركبة.

- مشطات الجملة العصبية (بما فيها الكحول) مثل: الأدوية المنومة، المهدئات، مضادات الهرسات، مضادات التشنج.

التحذيرات:

لا يؤخذ عند المصايبين بأذنيات الرأس والألام البطنية الحادة إلا بوصفة طبية.
يجب عدم تجاوز الجرعة الموصوفة من قبل الطبيب واستعمال الدواء لفترات طويلة قد يؤدي للإعياء.

يؤخذ بحذر: عند مرضى داء إيديوسون وضخامة البروستات و عند مرضى القصور الكبدي أو الكلوي الشديد وكذلك يؤخذ بحذر عند قيادة السيارات والعمل على الآلات.

الحمل والرضاع:

يجب أن يؤخذ بحذر في حالة الإرضاع. يصنف من الفئة C عند الحوامل، أي يجب أن يؤخذ باستشارة طبية و عندما تتفق متاعب الدواء على مخاطره.

فرض الجرعة:


قد يتسبب الجرعة المفرطة من الباراسيتامول أذية كبدية و كلوية. يجب عدم تجاوز الجرعة المقررة من قبل الطبيب أو المكتوبة في الشرة الطبية للدواء.

إن استعمال الدواء بشكل منظم وفترة طويلة من الزمن قد يسبب التحمل، وقد تقل فعاليته المسكنة للألم. قد يعتاد الجسم على الكودئين عند الاستعمال المديد للدواء.

الجرعة:

البالغين والأطفال فوق ١٢ سنة: (٢-١) مضغوطة (٤-٣) مرات يومياً.
العبوة: ٣٠ مضغوطة (٣ طوف من البلاستير) في عبوة كرتونية.

PK0258/02



التراميديكوكا للصناعات الدوائية: سوريا - دمشق - صيدنaya
هاتف: ٩٦٣ ١١ ٥٩٥٣٣٩ - فاكس: ٩٦٣ ١١ ٥٩٧٥١٧٤
بريد الكتروني: info@ultra-medica.net - www.ultra-medica.net